



Rassodamento delle braccia e delle cosce

Descrizione

Rimozione di cute e tessuto adiposo in esubero da braccia e gambe esitato dopo perdita importante di peso. Al fine di ottimizzare i costi a carico della cassa malati e di ridurre il numero di interventi, brachioplastica e cruroplastica possono anche essere effettuati nella stessa seduta operatoria. A questi possono poi aggiungersi anche addominoioplastica e liposuzione.

Narcosi

Anestesia generale.

Durata

Variabile da 2 a 3 ore a seconda della quantità di tessuto da rimuovere.

Degenza

3-4 giorni.

Inabilità lavorativa

Dalle 2 alle 4 settimane per un lavoro d'ufficio, 6 settimane per un lavoro che implica un maggiore impegno fisico (il rilascio di un certificato medico NON è permesso nei casi a valenza prettamente estetica).

Ritorno alla vita sociale

È richiesta una limitazione dei movimenti per i giorni successivi l'intervento chirurgico. La cura della persona con doccia può avvenire dal secondo/ terzo giorno dopo la rimozione dei drenaggi.

Comportamento post-operatorio

Dopo l'intervento chirurgico andrà indossata una guaina compressiva nel caso delle brachioplastica o pantaloni compressivi nel caso della cruroplastica per un periodo variabile dalle 4 alle 6 settimane, continuativamente per 24 ore al giorno.