



# Ricostruzione del capezzolo e dell'areola

---

## **Descrizione**

Ricostruzione completa del capezzolo dopo interventi oncologici che ne hanno obbligato la rimozione o dopo rimozione/necrosi del capezzolo in caso di riduzione mammaria complessa. In caso di chirurgia ricostruttiva può essere associato a trapianto di grasso autologo mammario ("lipofilling" o "autologous fat grafting").

## **Narcosi**

Anestesia locale o generale in caso di associazione con trapianto di grasso autologo.

## **Durata**

1 ora.

## **Degenza**

Ambulante (Ospedale di giorno, "day hospital").

## **Inabilità lavorativa**

1 settimana per un lavoro d'ufficio, 2 settimane per un lavoro che implica un maggiore impegno fisico.

## **Ritorno alla vita sociale**

Subito dopo l'intervento.

## **Comportamento post-operatorio**

La cura della persona con doccia può avvenire dal secondo/terzo giorno dopo l'intervento. Dopo l'intervento chirurgico andrà indossata una medicazione protettiva, sotto il reggiseno, per evitare compressione sul capezzolo ricostruito per circa 4 settimane. In caso di trapianto di grasso autologo effettuato in contemporanea, è prevista una fascia compressiva su misura per ca. 6 settimane nella zona di prelievo.