

Informazione per pazienti in trattamento con l'anticoagulante ELIQUIS® (Apixaban)



Etichetta paziente

Da qualche giorno riceve un trattamento anticoagulante (per rendere il sangue più fluido) con il farmaco Eliquis®. Nel suo caso, il trattamento le è stato prescritto per:

- Fibrillazione atriale
- Trattamento della trombosi e/o embolia polmonare (EP)
- Prevenzione della trombosi venosa profonda (TVP) recidivante e della EP
- Profilassi della trombosi

Osservazioni:.....

ASSUNZIONE	<p>Assuma il farmaco REGOLARMENTE, ogni giorno, circa alla stessa ora.</p> <p><u>Se si dimentica di assumere una pastiglia:</u> Prenda la pastiglia al più presto. Poi continui l'assunzione come di consueto.</p> <p>Attenzione: non assuma mai 2 pastiglie contemporaneamente.</p>
CONTROLLI	<p>È importante controllare la funzione renale. Da concordare con il medico curante la frequenza del controllo.</p>
PRECAUZIONI	<p>La terapia anticoagulante non è pericolosa se assunta correttamente. Ci sarà però la tendenza a sanguinare più facilmente. Per questa ragione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Eviti attività o sport che comportano un elevato rischio di traumi e ferite. ➤ Eviti iniezioni intramuscolari. Sono permesse le iniezioni sottocutanee o endovenose. ➤ Non assuma farmaci all'infuori di quelli prescritti dal medico (nemmeno farmaci a base di piante) poiché la combinazione con alcuni farmaci potrebbe favorire dei sanguinamenti. ➤ In caso di dolori o febbre può assumere del paracetamolo (Dafalgan®, Panadol®, Becetamol®, Zolben®, Ben-U-Ron®, Acetalgine®). L'assunzione eventuale di Aspirina® o antiinfiammatori andrebbe evitata se possibile ed è sempre da discutere e concordare con il medico.
QUANDO È NECESSARIO CONSULTARE IL MEDICO	<p>Se si manifestano:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ sanguinamenti dal naso o dalle gengive abbondanti e frequenti ➤ presenza di sangue nelle urine, nelle feci o feci nere ➤ presenza di sangue nello sputo o nel vomito ➤ ematomi spontanei frequenti ➤ ciclo mestruale particolarmente abbondante <p>Se sospetta una gravidanza chiami immediatamente il suo medico.</p>
DA RICORDARE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Porti sempre con sé la tessera di anticoagulazione e la tessera del gruppo sanguigno. ➤ Informi il medico, il dentista o il farmacista che è anticoagulato. Presenti loro la tessera di anticoagulazione in particolar modo se è previsto un intervento chirurgico. ➤ Non interrompa il trattamento con il farmaco senza l'accordo del medico.

Questa pagina è da consegnare al paziente.

Informazione per pazienti in trattamento con l'anticoagulante ELIQUIS® (Apixaban)

Etichetta paziente

VERIFICA DELLA COMPrensIONE DELLE INFORMAZIONI DATE E CONSEGNA MATERIALE EDUCATIVO

(Non consegnare questa pagina al paziente)

1. Eseguita l'educazione al paziente e consegnati i seguenti documenti:

- Tessera anticoagulazione del farmaco prescritto
- La pagina 1 di questo modulo M-EOFARM-169
- La brochure sul farmaco pubblicata dalla ditta

Data e firma personale curante:.....

2. Verificata la comprensione del paziente delle informazioni ricevute (compilare la tabella seguente e se necessario il focus infermieristico "Gestione della terapia").

	Data prima verifica:		Data seconda verifica (se necessaria):	
	
	Firma:.....		Firma:.....	
INFORMAZIONI VERIFICATE	SI	NO	SI	NO
Il paziente conosce il nome del farmaco e la dose?				
Il paziente conosce quando e come assumere il farmaco?				
Il paziente sa cosa fare se dimentica una dose del farmaco?				
Il paziente sa cosa deve portare sempre con sé, informando medico, dentista e farmacista?				
Il paziente sa in che situazioni si deve rivolgere al medico?				
Il paziente sa che farmaci può assumere in caso di febbre o dolori?				

Osservazioni:

.....
.....
.....

Attenzione: in presenza di interazioni farmacologiche, di polimedicazione o di fattori di rischio particolari (insufficienza renale o altro), è possibile contattare i farmacisti clinici dell'Istituto di Scienze farmacologiche della Svizzera italiana (ISFSI) per l'educazione al paziente in merito alla terapia anticoagulante e la revisione della terapia alla dimissione.